

پرازیت در مدفوع رهنمایی مریض برای اخذ نمونه برای معاینه

کیست ، تخم کرم ، کریبتوسپوریدیا ، تروفوزوئیت ها

در هنگام گرفتن معاینه ضرورت است:


- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقی
- قوطی دارای سرپوش زرد ، Para-Pak® SAF ، Fixative (Meridian Bioscience Inc) حاوی فرمالدئید و قاشق.
- اگر نمونه با پوست ارسال می شود ضرور است تا: کیپسول انتقال و پاکت پوستی با آدرس و هزینه پوستی

این طور انجام دهید:

قوطی مدفوع و در صورت انتقال کیپسول انتقال و نسخه اخذ نمونه را با نام، شماره شناسایی و تاریخ اخذ نمونه نشانی کنید.

مدفوع را روی یک کاغذ یا در یک ظرف پاک جمع آوری کنید.

3. از قاشق تهیه شده در سرپوش زرد قرار دارد استفاده کنید و قوطی مدفوع را تا قسمت مایع که به علامت سرخ برسد پُر کنید. تصویر که در سمت راست را ببینید. توجه داشته باشید که مقدار مدفوع درست باشد! از مخلوط کردن با ادرار و آب از



توالت خودداری کنید.

4. قاشق را دوباره به سرپوش قوطی گذاشته و سرقوطی را محکم کنید. قوطی را تکان دهید تا مواد با هم یکجا شود.

5. SAF حاوی فرمالدئید است ، با احتیاط نمونه برداری را انجام دهید. در صورت تماس با پوست جلد، بلافاصله با صابون و آب بشویید. در صورت بروز علائم بلافاصله با دوکتور خود تماس بگیرید. در صورت خوردن این مواد، فوراً با دوکتور یا مرکز صحتی سمی تماس بگیرید.

6. نمونه باید به سرعت به مرکز صحتی، پذیرش ، بخش مراقبت یا معاینه لابلاتوار ارسال شود.

7. نمونه خود را در یخچال (+2 تا -8 درجه سانتیگراد) در حالی که منتظر انتقال هستید نگهدار کنید.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید: مکروب شناس، شماره تلفون : 063-15 36 25