

کپک در ادرار- نمونه گیری خود مریض

در هنگام نمونه گرفتن ضرورت است:

- نسخه معاینه ارجاع شده توسط داکتر: الکترونیکی (برچسب - کاس میک) یا هم نسخه معاینه ورقی
- جمع آوری ادرار در قوطی پلاستیکی

اینطور انجام دهید:

1. قوطی ادرار با نام ، شماره شناسایی، تاریخ گرفتن نمونه و زمان جمع آوری (زمان شروع و پایان) نشانی کنید. در صورت موجودیت نسخه را نیز ضمیمه نمایید.

2. ادرار را بین ساعت 10:00 و 11:00 در قوطی پلاستیکی جمع کنید، گزینه دیگر 24 ساعت در شبانه روز می باشد.

3. توجه: از گرفتن جمع آوری ادرار در روز جمعه و روز قبل از رختی خودداری کنید.

4. نمونه باید بلافاصله به لابلاتوار سپرده شود. این برای نتیجه ی تجزیه و تحلیل بهتر در هنگام شناسایی میکروب های زنده (میراسیدیا) مهم است.

5. در صورتیکه نمونه با موثر به مرکز صحتی انتقال داده می شود، قوطی پلاستیکی را در یخچال (2-8 درجه سانتیگراد) تا روز بعد که انتقال داده می شود نگهداری نمایید.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید: میکروب شناس، شماره تلفون : 063-15 36 25

